

PAPAVERACEAE

(Subdivisión Magnoliophytina, clase Magnoliopsida, subclase Ranunculidae)

12. *Chelidonium majus* L.

Cast.: Celidonia, hierba golondrinera

Eusk.: Zaran belar



Lámina de Köhler (1887)

Caracteres diagnósticos:

Hierba perenne, con un rizoma carnoso del que salen varios tallos aéreos de hasta 80 cm de altura, muy ramificados y frágiles. Toda la planta produce un característico **látex anaranjado**. Hojas **alternas**, **pinnatisectas**, con 3-5 lóbulos irregularmente crenados-pinnatifidos y obtusos, ± glaucos por el envés y pilosos. Flores en inflorescencias umbeliformes terminales. Cáliz formado por dos sépalos verdosos, caedizos en la antesis. Corola (1,5-2,5 cm diám.) de **4 pétalos amarillos**. Estambres numerosos. Gineceo bicarpelar, con ovario súpero que fructifica en una **cápsula alargada** (3-5 cm) de dehiscencia valvar, que recuerda a una silicua (al abrirse caen las dos valvas, permaneciendo la zona de las placentas con las semillas). Semillas con arilo.

Florece desde la primavera a finales del verano.

Forma vital: Hemicriptófito.

Ecología y distribución en la Península Ibérica:

Herbazales ruderales, nitrófilos, en lugares sombreados y frescos, sobre todo en tapias y viejos muros. En casi toda la Península.

Distribución general:

Circumboreal holártica.