


CANNABACEAE

(Subdivisión Magnoliophytina, clase Magnoliopsida, subclase Hamamelididae)

17. Cannabis sativa L. subsp. **indica** (Lam.) Small & Cronqu.

Cast.: Marihuana, cáñamo

Eusk.: Kalamu, marihuana



Cannabis sativa (tomada de Kohler 1887)

Caracteres diagnósticos:

Hierba anual, con tallo erecto, estriado longitudinalmente, que puede alcanzar hasta los 3 m de altura. Hojas **alternas, palmaticompuestas**, con 5-7 folíolos lanceolados, acuminados, de margen serrado. Dioica, las flores tienen perianto monoclamídeo, y son poco llamativas. Las masculinas se agrupan en panículas laxas; las femeninas en glomérulos compactos en la axila de las brácteas superiores. Toda la planta tiene abundantes pelos simples y, en la región de la inflorescencia femenina, también abundantes **pelos secretores** (que producen la resina conocida como hachís).

Florece a finales de verano.

Forma vital: Terófito.

Observaciones:

Como todas las plantas cultivadas, presenta una gran variabilidad producida por selección artificial. Las variedades cultivadas para obtener fibra (cáñamo), con pelos secretores mucho más escasos, se incluyen en la subespecie *sativa*.

Ecología y distribución en la Península Ibérica:

Cultivada, y a veces asilvestrada.

Distribución general:

Originaria de Asia Central (Himalaya), se cultiva hoy en día en todo el mundo.