

VERBENACEAE

(Subdivisión Magnoliophytina, clase Magnoliopsida, subclase Lamiidae)

52. *Vitex agnus-castus* L.

Cast.: Sauzgatillo

Eusk.: Zalitzuki



Caracteres diagnósticos:

Arbusto o arbolito muy ramificado, de hasta 6 m de altura. Las ramas, largas y flexibles, tienen sección cuadrangular y epidermis pubescente cuando son jóvenes. Hojas **opuestas, palmaticompuestas**, pecioladas, con 5-7 foliolos lanceolados de hasta 13 cm de longitud, agudos. Haz de color verde y envés pubescente, grisáceo. Flores en cimas condensadas en las axilas de brácteas opuestas, formando una **larga panícula** en el ápice y los nudos superiores de las ramas. Cáliz pentámero, tomentoso, de 2,5-3,5 mm de longitud. Corola **azul claro** (a veces blanquecina) fusionada en un tubo de unos 8 mm de longitud abierto en 5 lóbulos desiguales (zigomorfa: el lóbulo inferior está bastante más desarrollado que los demás), reflejos (= vueltos hacia atrás) en la floración. 4 estambres, fusionados por sus filamentos al tubo de la corola, exertos (los filamentos son más largos que el tubo corolino y las anteras quedan fuera de éste). Ovario súpero, bicarpelar, que fructifica en una drupa negruzca (ilustración inferior: frutos todavía inmaduros).

Florece hacia mediados del verano.

Forma vital: Fanerófito.



Ecología y distribución en la Península Ibérica:

Áreas de clima mediterráneo con inviernos suaves (áreas costeras levantinas y andaluzas), en lugares con capa freática próxima a la superficie, como ramblas y riberas fluviales. Fuera de su área natural se cultiva a veces como ornamental.

Distribución general:

Mediterráneo.

Notas sobre conservación:

Aparece en el catálogo balear de especies amenazadas, considerada como de interés especial (Decreto 24/1992, BOCAIB del 2 de abril de 1992).