

LAMIACEAE

(Subdivisión Magnoliophytina, clase Magnoliopsida, subclase Lamiidae)

56. *Rosmarinus officinalis* L.

Cast.: Romero

Eusk.: Erromero



Il. de Köhler (1887)



Caracteres diagnósticos:

Arbusto perennifolio, de hasta 2 m de altura, muy ramificado desde su base. Ramas ortótropas. Hojas **opuestas, lineares** (15-40 x 1,5-3,5 mm) y coriáceas, con el margen **revoluto**. Haz prácticamente glabro, verde oscuro, y envés tomentoso, blanco.

Inflorescencias en verticilastros laxos, en la axila de las hojas situadas hacia el extremo de las ramas. Cáliz bilabiado. Corola azul pálido, fusionada en tubo y bilabiada, con el labio superior plano (no convexo) y formado por dos lóbulos bien visibles.

Androceo formado por **2 estambres** con filamentos bastante más largos que el tubo de la corola (exsertos). Gineceo con ovario súpero bicarpelar que fructifica en un lomento con 4 clusas.

Florece a comienzos de primavera, aunque pueden encontrarse flores prácticamente durante todo el año.

Forma vital: Fanerófito.

Ecología y distribución en la Península Ibérica:

Forma matorrales en regiones más o menos áridas, frecuentemente sobre calizas. Común en la Región Mediterránea.

Distribución general:

Región Mediterránea. Fuera de ella, frecuentemente cultivado por sus usos medicinales o culinarios.

Notas sobre conservación:

La recolección de esta especie con fines etnobotánicos (dentro de los cuales se incluye su uso como planta medicinal) está regulada legalmente en Andalucía por la Orden de 2 de junio de 1997, BOJA del 21 de junio de 1997.